



## **کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در اسب بودیونی: گزارش موردی**

**سید مهدی قمصری<sup>۱</sup>، امید آذری<sup>۱\*</sup>، فریرز معیر<sup>۲</sup>، علی روستایی<sup>۱</sup>، سیده حورا مرتضوی<sup>۳</sup>**

۱ گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

۲ گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.

۳ دانشجوی دکتری حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

### **چکیده**

کارسینوم سلول-سنگفرشی (*Squamous Cell Carcinoma*) یک نئوپلازی بدخیم است که از اپیتلیوم سنگفرشی مطابق ناشی می‌شود و به‌عنوان شایع‌ترین تومور دهان در اسب‌ها شناخته می‌شود. این گزارش موردی، ویژگی‌های بالینی و بافت‌شناسی یک کارسینومای سلول سنگفرشی لثه را در یک اسب بودیونی ۲۳ ساله با سابقه درمان‌های ناموفق متعدد، از جمله تلاش ناموفق برای برداشت تومور توسط جراحی، توصیف می‌کند. این اسب با یک توده نرم وسیع، ترشح بیش از حد بزاق و بیرون افتادن زبان به جانب به بیمارستان ارجاع شد. یافته‌های آزمایشگاهی حاکی از آنمی مرتبط با سرطان بود و بررسی‌های تصویربرداری تشخیصی، تخریب استخوان فک پایین و ماهیت مخرب توده را نشان داد. بررسی بافت‌شناسی تشخیص کارسینومای سلول سنگفرشی لثه را تأیید کرد که با تشکیل مرواریدهای کراتینی و شاخص میتوتیک بالا مشخص می‌شود. صاحب اسب به دلیل پیش‌آگهی ضعیف و هزینه‌های بالای درمان، از مداخلات درمانی بیشتر صرف‌نظر کرد و این اسب ۶ ماه پس از مراجعه تلف شد. در این گزارش، به چالش‌های مدیریت کارسینومای سلول سنگفرشی پیشرفته لثه در اسب‌ها و اهمیت تشخیص زودهنگام این عارضه و مداخله درمانی مناسب را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### **واژگان کلیدی**

اسب، محوطه دهانی، تومور، کارسینوم سلول سنگفرشی

\* نویسنده مسئول: امید آذری  
Omid.azari@ut.ac.ir